

Contenção de Grandes Animais

EQUINOS

- -Antes de abortar os eqüinos, deve-se observar o comportamento do animal. Atentando-se para o posicionamento das orelhas.
- -O veterinário ou o ajudante deve se aproximar posicionando-se à esquerda desse animal (em virtude da colocação de equipamentos ser realizada deste lado).
- -Deve se aproximar do animal lentamente com corda ou cabresto. Uma vez permitida a aproximação, deve-se fazer a abordagem manual, acariciando o animal, e assim passando o braço ao redor de seu pescoço com uma corda.

- *Quando estiver num local pequeno e fechado (baia) nunca fechar a porta, para eventuais emergências.
- *Nunca amarrar o animal pelo pescoço, pois em queda acidental ou uma tentativa de fuga poderá resultar em óbito por asfixia.

Contenção de Potros:

- deve-se contê-lo na posição quadrupedal
- -posicionando-se ao seu lado, passando uma mão em volta da musculatura peitoral e outra por trás da coxa ou na base da cauda (suspendendo-a)



- 1- *Tronco de Contenção*: a superfície não deve ser escorregadia e o local de exame deve ser alto para evitar traumas cranioencefálicos. O proprietário ou o condutor do animal, deve entrar juntamente com o animal dentro do tronco, e em determinado momento deve se fechar o tronco, com uma barra na parte frontal e uma porta na parte traseira.



DC-1000/4
Torrinha

Brejo para contenção de eqüinos

- *2-Cachimbo ou Pito*: utilizado em animais não cooperativos, pois sua passagem no lábio inferior ou superior, com posterior torção, induzirá a uma dor considerável, o que obrigará o animal a se manter quieto.
- Como colocar:
- -segure o cabo do cachimbo com a mão que possua maior firmeza e agilidade
- -coloque os dedos da mão oposta a laçada e segure o lábio superior, elevando-o discretamente.
- -deslize a laçada por entre os seus dedos, envolvendo o máximo que puder o lábio
- -aperte a laçada rapidamente
- -fique atento para possíveis reações do animal





- 3- *Torção de Orelha*: para uma contenção rápida
- *cuidar para não causar dano à cartilagem aural, o que causará uma alteração irreversível do seu posicionamento (orelha caída).

1



2



3



4



5



6



- 4-*Mão ou Pé-de-amigo*: tira-se um dos membros do solo, tirando-lhe o apoio.
- *geralmente os animais não permitem a elevação de um dos membros posteriores por muito tempo.



-Derrubamento de Eqüinos

- Geralmente utiliza-se cordas.
- -Método dos Travões
- -Método Antigo
- -Método Nacional





Bovinos

- A maioria dos procedimentos de exame físico podem ser realizados com o animal em posição quadrupedal, desde que se faça uma boa contenção da cabeça e limite os movimentos dos membros e do corpo.
- *fêmeas de bovinos deve-se fazer a aproximação pelo lado direito, por onde são normalmente ordenhadas.

- 1- *Tronco de Contenção*: é diferente em relação ao dos eqüinos. Pois pode se fixar a cabeça do bovino e limitar sua ação.





- *2-Formiga*: pode ser feita com o dedo médio e o polegar ou com um instrumento de ferro. Onde se introduz os dedos ou o instrumento no nariz do animal, e pressiona-se o septo nasal, exercendo uma pressão considerável. Normalmente utilizado em animais não cooperativos





-Derrubamento:

- -Deve-se tomar cuidado na derrubada de bovinos para evitar traumas aos chifres, costelas, ossatura pélvica e/ou abortos.
- -O animal deve ser lentamente derrubado em local macio, segurando-se sua cabeça com cuidado.
- -Método de Rueff
- -Método Italiano





